



**CRECR**

## PRODUCTO BIOLÓGICO DISEÑADO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN CULTIVOS EXTENSIVOS DE GRAMÍNEAS

### BENEFICIOS

- Mayor aprovechamiento de nutrientes, que permite incrementar el rendimiento y calidad del grano, y disminuir paulatinamente la fertilización
- Disminuye la incidencia de enfermedades fúngicas
- Promueve el desarrollo foliar, llenado de grano y soporte de estrés hídrico
- Estimula el desarrollo de la raíz, incrementando su capacidad absorbente y su fuerza de sostén
- Amacollamiento superior: incremento entre 10% y 20%
- Menor acame: plantas de mejor porte y con mayor resistencia al daño mecánico

### CARACTERÍSTICAS

Es un inoculante en forma de polvo mojable gris claro con altas concentraciones de fijadores de nitrógeno, solubilizadores de minerales y hongos protectores de raíz. **CreCR** durante el ciclo permiten incrementar el rendimiento entre 10% y 15%.

### ALMACENAMIENTO

El producto es un fermento activo de microorganismos vivos por lo que se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de temperatura y presión (CNTP). En estas condiciones, el producto se puede almacenar por seis meses en su empaque original.

### INGREDIENTES

Concentrado de microorganismos:	15%
Carbonato de Calcio:	35%
Dextrosa:	25%
Extracto de levadura:	20%
Aminoácidos:	5%

### MODO DE PREPARACIÓN

En riego: Suspender 1.5 Kg de producto en 400 L de agua y dejar reposar por 12 o 16 horas. Aplicar el líquido por línea de riego o en drench.  
A la semilla: Suspender 2 Kg de producto en 20 L de agua, y aplicar por aspersión sobre las semillas equivalentes a una hectárea (puede variar dependiendo del cultivo). Dejar secar las semillas al aire. Se recomienda sembrar en un periodo máximo de 48 horas, para evitar germinación prematura.

### DOSIS

2 Kg sobre semilla antes de siembra, única aplicación. 1.5 Kg (reposado 12-18 h) en 400 L de agua para aplicación por riego, con cada riego.

### COMPATIBILIDAD

Para obtener el óptimo efecto del **CreCR** se recomienda no mezclar con ácidos o bases fuertes. El rango de pH de efectividad del producto no puede ser menor a 3 o superior a 9.5.

Cobertura de semilla: El producto es compatible con la mayoría de los fungicidas de cobertura de semillas. En riego: Se recomienda no aplicar fungicidas o bactericidas al menos 5 días antes o 5 días después de aplicar **CreCR**

### PRECAUCIÓN

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte a su médico. Al contacto con los ojos: enjuague con abundante agua y consulte a su médico. En caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el producto y consulte a su médico.